

## 8. ¿Que puedo esperar del malestar?

Su pierna puede sentirse adolorida para los primeros días después del tratamiento. Caminar regularmente ayuda a controlar el malestar. Usted también puede tomar una medicación anti-inflamatorios ( ejemplo, Motrin, Advil, y Aleve ) para minimizar el dolor. Tomar un día libre de trabajo puede ser agradable, pero no es necesario, aunque debe evitar largos periodos de pie o sentado en los primeros días. Usted puede regresar a su rutina regular de inmediato, con la excepción de las actividades de alto impacto aeróbico y de pesas. Usted tendrá que seguir usando la media de compresión durante el día por dos semanas.

## 9. ¿Cuantos tratamientos voy a necesitar?


Usted quiere dar su primer tratamiento por lo menos cuatro semanas para realmente evaluar los resultados. Vas a volver a la oficina cerca de dos semanas después de su primer tratamiento para asegurarse de que están sanado bien y evacuar la sangre que puede permanecer atrapados en las venas tratadas. El tratamiento adicional es individual, y la mas extensa de su enfermedad de las venas, mas el tratamiento necesarios para lograr los resultado deseados. Su medico debe ser capaz de dar una idea general de lo que puede esperar.

Rev. 5/11

Los Médicos del Centro de  
Varices

Dr. Dominic J. Tedesco

Dr. Lamar J. Bushnell



## Centro de Varices

---

## Preguntas y Respuestas Sobre la Escleroterapia

---



168 N. Brent St., Suite 508  
Ventura, CA 93003  
Teléfono: (805) 643-2855  
Fax: (805) 643-3511  
[www.veincv.com](http://www.veincv.com)

## Preguntas y Respuestas Sobre la Escleroterapia

### 1. ¿Su medico ha recomendado la escleroterapia. Que necesita saber?

La escleroterapia es útil en el tratamiento de varices superficiales y venas de araña? Y puede ser utilizada como tratamiento primario, o después de la terapia con láser y/o flebectomía de enfermedad de las venas mas complicadas. Consiste en la inyección esclerosante ( un detergente como medicamento ) directamente en las venas enfermas, lo que hace que se esclerosados (cerrado ) y luego ser reabsorbido por el cuerpo. Este proceso toma tiempo para realizar el efecto completo, y se requiere su cooperación en el uso de medias de compresión durante al menos dos semanas después del tratamiento, también debe de caminar diario para mantener el flujo sanguíneo venoso y la curación

### 2. ¿Cubre el seguro el escleroterapia?

La mayoría de seguro no cubre la escleroterapia. Hay excepciones para las venas grandes que causan síntomas tales como hinchazón, dolor y úlceras en la piel. Si usted cree que su seguro cubrirá su escleroterapia estaríamos encantados de ayudarle en la obtención de autorizaciones, y la presentación para el reembolso. De lo contrario el pago debe hacerse en efectivo en el momento del servicio.

### 3. ¿Que tipo de medicamento se usa para la escleroterapia?

Utilizamos dos medicamentos para la escleroterapia Uno de ellos es polidocanol, que fue desarrollado inicialmente como un anestésico local. Actúa como un agente irritante para el forro interior de una vena, y hace que se inflamen, cerrar, y luego ser reabsorbido por el cuerpo.

La otra medicación que utilizamos es Sotradecol, y trabaja de forma similar. Ambos medicamentos se pueden inyectar directamente en las venas superficiales con una aguja pequeña. El medicamento que utilizamos son todos aprobados por la F.D.A para la escleroterapia, pero las formulaciones y métodos de entrega que utilizamos son de vez en cuando "fuera de la etiqueta", que significa que el medicamento o método de entrega no se formuló para este procedimiento específico.

### 4. ¿Que es la escleroterapia dirigida con ultrasonido?

Su medico puede desear utilizar el ultrasonido para visualizar mas profundo las venas mas grandes. Estas venas mas grandes pueden contribuir a la persistencia de la enfermedad de las venas superficiales de la alimentación de su flujo. Su medico le aconsejara sobre sus necesidades individuales.

### 5. ¿Que son las medias de compresión?

Se aplican gradualmente para disminuir la presión en el tobillo y continuando hasta la pierna hasta el muslo. La media debe estar precisamente medida a la pierna para proporcionar una cantidad especifica de presión para tener mejor resultados de sus tratamientos de escleroterapia. Usted necesitara su media antes de su primer tratamiento. Para su conveniencia le pueden medir aquí en la oficina cargamos una línea de medias de buena calidad. También te recomendamos Althea en Ventura. Llevan una serie de marcas, y están en mejores condiciones para trabajar con su seguro.

### 6. ¿Que puedo esperar de mi tratamiento inicial?

Su medico trabajara con usted para determinar cual venas responderán mejor al tratamiento, y cual venas son de mayor interés para usted. Por lo general, se puede tratar una serie de áreas en una o ambas piernas en una sola sesión de tratamiento. Usted puede esperar una pequeña molestia después de sus inyecciones. Venas tratadas inicialmente desaparecen de la vista, pero enseguida vuelven de color rojo de la esclerosante. A veces cubrimos los picazos con pequeños trozos de cinta médica para minimizar la salida de medicamentos y detener la hemorragia. Al terminar de su tratamiento tiene que ponerse su media de compresión, y usar la durante 24 horas.

### 7. ¿Que voy a ver cuando me quite la media de compresión?

Cuando se quita su media después de 24 horas del tratamiento también puede quitar las cintas, y bañarse normalmente. Se debe evitar el baño, las tinas calientes, y saunas durante varios días. Notara enrojecimiento y moretones en los primeros días. Esto es de esperar que las venas tratadas se inflaman, y las células sanguíneas se filtran a la piel. En ocasiones, la sangre puede quedar atrapada en una vena tratada, y comenzara a ver un color amarillo verdoso, y pueden sentirse llenos de nudos. Su cuerpo lo reabsorbe, pero, para acelerar este proceso, parte de esta sangre puede ser evacuado con inyecciones en la oficina.